

# TRICO-TOM



Contiene una mezcla de esporas nativas seleccionadas de TRICHODERMA sobre una matriz de harina de cereales, deshidratada y osmoacondicionada que actúa como antagonista de hongos de suelo ; FUSARIUM spp, PYTIUM spp PHYTOPHTORA spp, RIZOCTONIA spp y VERTICILLIUM spp.

TRICHODERMA es un hongo benéfico que actúa por parasitismo directo Antibiosis y competencia sobre patógenos de plantas. Su mayor efecto se logra en forma preventiva.

Reductor de inóculo primario de VENTURIA ( venturia inaequalis, venturia pirina), MONILINIA( monilinia spp.), SCLEROTINIA(sclerotinia sclerotium), MACROPHOMINA Spp PHOMA terrestres.

DOSIS aprox.  $10^{12}$  esporas por sobre.

## APLICAR

- 1.- Aplicar en cultivo de Tomate. De preferencia aplicar pre plantación dirigida a la superficie mas cercana a la raíz de la planta.
- 2.- Segunda aplicación al follaje , tratar de aplicar dirigida al cuello de la planta sobre el camellón.

## DURACIÓN

Los envases abiertos se deben usar en el día y los envases cerrados al vacío se garantizan hasta tres meses en refrigeración ( 5 Co a 10 Co )

## IMPORTANTE

Producto biológico manténgase protegido de la y altas temperaturas. Asegúrese que los equipos, filtros y estanques no tengan pesticidas.



NOTA Importante, si las boquillas del equipo son muy finas es posible que se tapen con el material que acompaña a las esporas el cual solo sirve de trasporte, le sugerimos poner un filtro sobre la boca de acceso al estanque.

**NO MEZCLAR CON FUNGUICIDAS**

## MODO DE USO PRODUCTO EN PLOVO



**1** Disolver contenido en balde y mezclar con agua.



**2** Enjuagar el contenido del sobre con agua de la mezcla. Aplicar en estanque del asperjador ("fumigador")



**3** Vaciar en el estanque del asperjador

Producto compatible con casi todos los fitosanitarios

### Elementos de seguridad



APLICACION



DOSIFICACION  
SOLIDOS



DOSIFICACION  
LIQUIDOS



DELANTAL



TRAJE COMPLETO



BOTAS



GUANTES



RESPIRADOR



PROTECTOR  
NARIZ Y BOCA



PROTECTOR FACIAL