

ZINGUE



Bioestimulante en base a Zinc quelatado orgánicamente, extracto de algas marinas, polioles naturales, aminoácidos, altamente eficiente. Actúa estimulando el metabolismo de la planta a través de una mayor inducción de formación de zeatina esto permite equilibrar las funciones fisiológicas a nivel de las células, desarrollando el potencial de cultivo.

BIOBENEFICIOS

- Estimula Fotosíntesis
- Evita Clorosis
- Aumenta Viabilidad del Polen.
- Aumenta tamaño de hojas y da mayor calibre de frutos.

COMPOSICIÓN

MICRO-ELEMENTO Y EXTRACTO		
Zinc (ZnO)	8	% P/V
Extractos de algas	50	% P/V



ZINGUE



INSTRUCCIONES DE USO.

Siempre calibre el equipo de aplicación, Agite el envase antes de usar, volumen de agua para asperjar en forma uniforme cubriendo la totalidad del follaje.

COMPATIBILIDAD.

PICHAZINC es compatible con todos los agroquímicos de acción neutra.

RECOMENDACIONES DE USO.

Agítese antes de usar

CULTIVO	CANTIDAD	EPOCA DE APLICACIÓN
NARAJOS, LINOMEROS OLIVOS, PALTOS	3 Lt / Ha	Aplicar en inducción de brotes primavera y en inducción brotes de otoño.
VID VINIFERA, VID PISQUERA	4 Lt / Ha	Con brote de 40 cm. y ha inicio de flor.
BERRIES	2 Lt / Ha 300 cc / 100 Lt Agua	2 aplicaciones antes de flor.
MANZANO, PERAL, MEMBRILLO	3 Lt / Ha	Desde puntas verde.
MELÓN, SANDÍA, PEPINO, ZAPALLO	2 Lt / Ha 250 cc / 100 Lt Agua	30 y 60 días después de transplante y en brotación.
TOMATE, AJÍ, PIMENTÓN	2 Lt / Ha 300 cc / 100 Lt Agua	30 y 60 días después de transplante y en brotación.
MAÍZ	2 Lt / Ha	4ta-6ta hoja.
TRIGO	2 Lt / Ha	Inicio macolla.
FREJOL, MARAVILLA, HABA, ARVEJA	2 Lt / Ha	Desde 3 era hoja verdadera.
BROCOLI, COLIFLOR, AJO, CEBOLLA, REPOLLO	2 Lt / Ha 250 cc / 100 Lt Agua	Aplicar 30 días después de transplante.
PAPA	2 Lt / Ha 250 cc / 100 Lt Agua	30 días después de emergencia.